

BROCUM

Esca topicida-ratticida pronta all'uso a base di Brodifacoum con Denatonio Benzoato.

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:

Brodifacoum	g	0,005
Denatonio benzoato puro	g	0,001
Coformulanti, sostanze appetenti e coloranti q.b. a	g	100

IL PRINCIPIO ATTIVO

Il Brodifacoum è fra i più recenti membri della famiglia dei rodenticidi anticoagulanti della seconda generazione, efficacissimo contro tutti i tipi di roditori (*Rattus rattus*, *Rattus norvegicus*, *Mus musculus*, ecc.), compresi quelli resistenti agli altri anticoagulanti.

Come per gli altri prodotti appartenenti alla classe dei rodenticidi anticoagulanti, la morte del roditore avviene per emorragia interna dopo 4-5 giorni dall'ingestione delle esche e perciò non suscitando diffidenza nei riguardi del prodotto da parte dei consimili. Anche qualora il roditore abbia ingerito una dose di principio attivo molto superiore a quella letale, la morte non viene anticipata.

Per ragioni di maggior sicurezza, soprattutto nei confronti dei bambini, BROCUM contiene Denatonio Benzoato che è considerato la sostanza più amara del mondo: inserita nelle esche topicide alla dose di 10 ppm (0,001%), può essere avvertita dal palato umano conferendo al formulato un sapore amarissimo che lo rende immangiabile. Alle stesse dosi non ha alcun effetto sui roditori che, perciò, se ne cibano avidamente.



LE CARATTERISTICHE

BROCUM può essere considerato un "rodenticida a dose singola". Infatti è sufficiente in media un'unica ingestione di meno di 2 grammi di esca per uccidere un ratto e di meno di 0,5 grammi per uccidere un topo.

Questa caratteristica produce due importanti vantaggi:

- è più difficile l'insorgenza di resistenze, causata dall'ingestione di quantitativi subletali di principio attivo;
- è sufficiente un basso quantitativo di esca per portare ad un completo controllo dei roditori; inoltre una volta ingerita la dose letale, il roditore smette di cibarsi e conseguentemente di provocare danni.

L'APPLICAZIONE

BROCUM viene rapidamente accettato dalle diverse specie di roditori, grazie agli appetenti e coformulanti alimentari di prima scelta impiegati per la sua formulazione. Una delle regole essenziali per ottenere buoni risultati, è quella di mantenere a disposizione dei roditori un quantitativo di esche esuberante e disposte in punti vicini fra loro. In questo modo i roditori possono incontrarle e consumarle facilmente, senza dovere entrare in competizione fra loro.

Nella prima fase della derattizzazione è importante che i punti di distribuzione siano spesso controllati (anche giornalmente) per reintegrarli di esca in modo da consentire un regolare consumo nell'arco dei primi 2-3 giorni.

Utilizzare le esche finite e pronte all'uso all'interno degli appositi contenitori per esche già in commercio ("mangiatoie", "erogatori", "stazioni" ecc.) oppure con idonee protezioni per evitare dispersione di esca nell'ambiente e l'accesso ai bambini, animali domestici e animali non bersaglio.

LA FORMULAZIONE

BROCUM è disponibile in varie formulazioni: pellet, farina, fioccato, grani, frumento, zollette paraffinate, candelotti con gancio paraffinati, bustine sfarinate. Queste forme fisiche sono utilizzabili in ogni condizione (luoghi umidi, locali polverosi, presenza di sorgenti di cibo competitive, ecc), soprattutto se associate all'uso di adatti erogatori (RISTORAT, linea PROTECTA, ecc).

LE INDICAZIONI

Leggere attentamente l'etichetta prima dell'uso.

Ulteriori importanti informazioni inerenti il prodotto sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

Poiché la Colkim non esercita alcun controllo sul modo d'impiego del prodotto, essa non si assume alcuna responsabilità in merito all'utilizzazione dello stesso.

Presidio Medico - Chirurgico. Uso civile.
Registrazione Ministero della Sanità n.14352 (Colkim)

In base alle norme vigenti in materia di Classificazione, Imballaggio ed Etichettatura dei preparati pericolosi - BROCUM è classificato NON PERICOLOSO e perciò in etichetta non è riportato alcun simbolo di pericolosità.